

Пожалуйста, прочитайте внимательно инструкцию по применению медицинского препарата.

"Eye-t® Эктоин"

Перед применением **"Eye-t® Эктоин"** внимательно прочитайте инструкцию. НЕ ВЫБРАСЫВАЙТЕ ЭТОТ ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ! Он содержит важную информацию. Если у Вас возникнут какие-либо вопросы в отношении **"Eye-t® Эктоин"**, пожалуйста, обратитесь к своему врачу.

1. Общая характеристика.

"Eye-t® Эктоин" – это изотонический раствор, содержащий Ectoin®, природную клеточно-защитную молекулу, снижающую воспаление, и имеющий мембранно- и липидостабилизирующие свойства.

"Eye-t® Эктоин" – снижает воспаление, вызванное раздражением или сухостью конъюнктивы, которые являются главными признаками синдрома сухих глаз.

"Eye-t® Эктоин" – смягчает симптомы сухих глаз, такие как жжение, сухость, зуд.

"Eye-t® Эктоин" увлажняет сухие глаза и дополнительно предотвращает дальнейшее обезвоживание.

"Eye-t® Эктоин" стабилизирует липидный слой слезной пленки и защищает клетки глаз от гиперосмолярности.

"Eye-t® Эктоин" способствует регенерации сухой и раздраженной конъюнктивы.

"Eye-t® Эктоин" подходит для чувствительных глаз.

"Eye-t® Эктоин" не содержит консервантов.

"Eye-t® Эктоин" подходит для профилактического применения.

2. Особенности применения.

- По рекомендации Вашего врача **"Eye-t® Эктоин"** может применяться после офтальмологической операции на глазах или травмы глаз.

- **"Eye-t® Эктоин"** не следует применять при гиперчувствительности к препарату Ectoin® или к какому-либо другому вспомогательному веществу глазных капель.

- При возникновении аллергических реакций применение **"Eye-t® Эктоин"** следует немедленно прекратить.

- Не применяйте поврежденные или проколотые ампулы.

- После применения одной ампулы оставшаяся в ней жидкость должна быть утилизирована; она не предназначена для последующего применения.

- Противопоказаний относительно применения препарата лицами, пользующимися контактными линзами, нет.

3. Взаимодействие "Eye-t® Эктоин" с другими препаратами.

"Eye-t® Эктоин" не взаимодействует с другими глазными каплями или глазными мазями для местного применения.

После применения **"Eye-t® Эктоин"** подождите как минимум 15 мин. перед нанесением какого-либо другого медицинского средства или другого препарата для глаз.

4. Применение во время беременности и кормления грудью.

Предостережений по применению **"Eye-t® Эктоин"** во время беременности и кормления грудью нет.

Перед применением этого медицинского средства проконсультируйтесь со своим врачом, если Вы:

- Беременны или кормите грудью;
- Не уверены по поводу беременности.

5. Способ применения и дозы.

Всегда применяйте **"Eye-t® Эктоин"** согласно этой инструкции. Перед применением обязательно проконсультируйтесь со своим врачом.

Если Ваш врач не назначил иначе, закапывать по 1-2 капли в каждый глаз несколько раз в день. Дети в возрасте до 10 лет не должны применять **"Eye-t® Эктоин"** самостоятельно.

1. Достаньте одну ампулу из стрип-упаковки (ячейки) и откройте ее, отломив верхнюю часть ампулы.
2. Откиньте голову назад, указательным пальцем оттяните нижнее веко вниз и посмотрите вверх.
3. Другой рукой осторожно сдавите ампулу, чтобы в глазной мешочек попали 1-2 капли препарата.
4. Ампула не должна касаться глаза. Чтобы раствор разошелся по всей поверхности глаза, медленно закройте глаз.
5. Повторите процедуру с другим глазом.

6. Возможные побочные реакции при применении "Eye-t ® Эктоин".

"Eye-t ® Эктоин" хорошо переносится. На данный момент нет сведений о побочных реакциях при применении препарата. В отдельных случаях "Eye-t ® Эктоин" может вызывать краткосрочное раздражение глаз, покраснение глаз или конъюнктивит. Если вы заметили побочные реакции, связанные с применением "Eye-t ® Эктоин", пожалуйста, обратитесь к своему врачу.

Если побочная реакция не проходит или усиливается, следует обратиться к своему врачу.

7. Условия хранения "Eye-t ® Эктоин"

Срок годности "Eye-t ® Эктоин" указан на упаковке и на ампулах.

После окончания срока годности применять "Eye-t ® Эктоин" запрещено.

"Eye-t ® Эктоин" следует хранить при температуре 2°C – 25°C.

"Eye-t ® Эктоин" находится в маленьких пластиковых ампулах, которые может проглотить ребенок. Остерегайтесь удушья! Во избежание этого "Eye-t ® Эктоин" следует хранить в недоступном для детей месте.

8. Содержимое (упаковки) "Eye-t ® Эктоин" и другая информация.

Ампулы по 0,5 мл №2, 5, 10, 15, 20, 30, 40 или 60, в зависимости от размера упаковки.

Вспомогательные вещества

Эктоин 0,5%, гидроксипропилцеллюлоза, сорбитол, вода и цитратный буфер.

9. Владелец регистрационного свидетельства /Производитель



bitor AG

Stockumer Str. 28,
58453 Witten, **Germany**
Pharma Stulln GmbH,
Werksstraße 3,
92551 Stulln, **Germany**













для:

FARMAPLANT
Fabrikation Chemischer
Produkte GmbH,
Alter Wall 69,
20457 Hamburg, **Germany**

Адрес официального
представительства
компании **FARMAPLANT**
Fabrikation Chemischer
Produkte GmbH в
Украине: ул. Липская, 9а,

Оф. 31
Украина, 01021 Киев

10. Дата пересмотра информации: Октябрь 2013, пересмотрено 05.
Объяснение символов, обозначенных на продукте.

	Маркировано CE с номером уполномоченного органа
	Номер партии
	Срок годности
	Пожалуйста, утилизируйте жидкость, оставшуюся после применения
	Производитель
	Внимание! Ознакомьтесь с инструкцией по применению (особенно с разделом "Особенности применения")
	Температурное ограничение
	Пожалуйста, обратитесь к инструкции по применению
	Пожалуйста, не применяйте поврежденные или проколотые ампулы
	Препарат стерилизован асептической фильтрацией